



מרץ 2020

### התמודדות עם דיספניאה כתוצאה מנגיף SARS-CoV-2 (COVID-19)

1. חמצן עם מסכה עם רזרבואר או משקפי חמצן. יש לתת מנת העמסה ולטפל בהתאם לטבלה:

#### 1.1 טיטרציה Morphine לקוצר נשימה:

מורפין IV/SC במינון 5mg ניתן לחזור על מנת העמסה אחת ל 10 דקות (במתן IV) ו 20 דקות (במתן SC) ניתן להעלות מינון עד 10 מ"ג	מטופל נאיבי לאופיואידים	<b>מנות העמסה</b>
חשב OME/24h (Oral Morphine Equivalent) . תן מנת הצלה 10%-20% מהמנה היומית <b>OME →</b> 15mg Morphine = 10 mg Oxycodone IV Morphine 10mg = 30mg PO IV = 1/3 Morphine PO ערך מדבקת פנטניל = SC/IV Morphine mg/24h לדוגמה: fentanyl patch 100mcg → IV/SC Morphine 100 mg	מטופל שאינו נאיבי לאופיואידים	<b>מנות העמסה</b>
<b>עירוי מתמשך:</b> יש להתחיל את העירוי בקצב התחלתי 2mg/h או בהתאם לסך המינון ביממה חלקי 24 שעות <b>עדכון מנון ליממה:</b> מנון בסיס יום קודם + סך מנות הצלה/24 ש		<b>עירוי מתמשך</b>
10-20% מסך המינון ליממה, עד כל רבע שעה (IV) ועד כל חצי שעה (SC)		<b>מנות הצלה</b>