



– טיוטא לנספח להוראת עבודה בחלופה תרופתית לשימוש בסדציה פליאטיבית –

LEVOMEPRMAZINE / METHOTRIMEPRAZINE

1. רקע

טיוטא לנספח להוראת עבודה זו נועדה למצוא חלופה תרופתית במידה ויהיה מחסור בתרופה השכיחה בשימוש לסדציה פליאטיבית (MIDAZOLAM), בשמה LEVOMEPRMAZINE /METHOTRIMEPRAZINE

2. מטרה

שימוש בתרופה אנטיפסיכוטית, מרדימה בהתווייתה לשליטה בדליריום ו/או אגיטציה אצל חולה נוטה למות בשלב סופי של מחלתו.

3. פירוט:

יתרונות

תרופה יעילה להשריית סדציה, נוגדת כאבים וחרדה, עם השפעה מהירה לטיפול בבחילות הקאות דליריום ואגיטציה

חסרונות

אנטיכולינרגית, תת לחץ דם עמידתי, תופעות אקסטרופירמידליות, פרכוס, הארכת מקטע QT.

מינון טיפולי אפקטיבי בעירוי סביב השעון	מינון התחלתי בעירוי סביב השעון	מנת העמסה
50-300 MG ליום במידה ולא הושג האפקט הרצוי ניתן להעלות מינון של 12.5-25 מ"ג פעם בשעה	50-75 MG ליום (IV/SC/IM)	12.5-50 MG (IV/SC/IM)

מסמכים ישימים:

- 1.Cherny NI, Portenoy RK. Sedation in the management of refractory symptoms: guidelines for evaluation and treatment. J Palliat Care 1994; 10:31.
2. Bruera E et. Al. Textbook of palliative medicine and supportive care, 2nd edition.